

# VERZORGING VACHT BIJ HONDEN

Vachtsoort	Voorbeeld	Beschrijving vacht	Verzorging
Stokhaar	Kort haar: Rottweiler, Labrador Retriever Lang haar: Samojeed, Schotse Herdershond	Dubbele vacht, ruit in voor- en najaar in ondervacht. - ondervacht van zacht wollig haar. - dekhaar; dikkere en stuggere haren	1 x per week met grove kam tijdens rui: onderwol verwijderen met uitdun kam, hierna 4 weken vacht met rust laten
Kort / Gladhaar	Dobermann, Boxer	Kort dekhaar en geen ondervacht, deze hond verhaart het hele jaar door	Bij veel en vuile haren potsen met rubberen borstel of zemenlap. Een borstel met zachte haren geeft meer glans.
Langhaar	Met weinig onderwol: Ierse Setter, Engelse Cocker Spaniël, Drentse Patrijshond Met veel onderwol: Bobtail, Briard, Hollandse Schapendoes	Lang dekhaar met weinig onderwol, verhaart periodiek steeds een gedeelte van de onderwol en de dekharen Lang dekhaar met veel onderwol verhaart het hele jaar door. Kan op klitvorming in onderwol.	Hoe langer de vacht, hoe meer onderhoud. 2 x per week met borstel of kam. Bij langer haar, eerst met de hand tegen de haarrichting en vervolgens met borstel of kam. Ter voorkoming van klitten regelmatig kammen.
Kroeshaar	Poedel, Bedlington Terriër	Voornamelijk onderwol, die wel verhaart maar door de langzame verharingscyclus er lang kan worden.	Regelmatig knippen of scheren.
Ruwhaar	Cairn Terriër, Airedeale Terriër, Bouvier	Dubbele vacht, verhaart 2 x per jaar in dekhaar.	Moet 2 x per jaar geplukt worden in het dekhaar. Laat de onderwol intact. 1 x per week met een kam is voldoende.
Vilthaar	Komondor, Puli	Dubbele vacht met veel, lang onderwol, die op een natuurlijke manier snel vervilt.	Deze vachten worden bijna niet gekamd of geborsteld, alleen bij de huid.
Haarloos	Mexicaanse Naakthond, Chinese Gekuijde Naakthond	Nagenoeg geen vacht, alleen bij kop, poten en staart.	Alleen schoonmaken met een washandje.



Kam met handvat



Uitdunkam



Uitdunkam breed



Uitdunkam fijn



Kam



Zachte borstel